

Преодоление налоксоном передозировки опиоидами

1. ОСМОТР

Распознавайте признаки передозировки опиоидами


- Потеря сознания, неспособность реагировать или очнуться.
- Медленное, слабое дыхание; затруднение дыхания.
- Удушье; бульканье или храп при дыхании.
- Ногти или губы синеют или багровеют.



2. ПРОВЕРКА

Проверьте дыхание пострадавшего и попытайтесь привести его в чувство

- Убедитесь в том, что грудь пострадавшего поднимается и опускается.
- Приложите ухо ко рту пострадавшего, чтобы услышать и почувствовать его дыхание.
- Кричите и встряхивайте пострадавшего.
- Крепко постучите по груди пострадавшего.



3. ВЫЗОВ ПО ТЕЛЕФОНУ

Позвоните по телефону 911


- Скажите: «Человек не дышит!»
- Скажите также: «Кажется, наблюдается передозировка опиоидами, и у меня есть налоксон».



4. ДЫХАНИЕ

Поддерживайте дыхание, часто нажимая на грудь пострадавшего.

- Если вы не возражаете, дважды примените искусственное дыхание.
- Часто нажимайте на грудь пострадавшего в течение двух минут.



5. ВПРЫСК ПРЕПАРАТА

Если пострадавший не реагирует, примените налоксон


НАЗАЛЬНЫЙ СПРЕЙ NARCAN®.

1. Удерживайте устройство большим пальцем с нижней стороны поршня и двумя другими пальцами вокруг наконечника.
2. Впрысните препарат, плотно вложив устройство в ноздрю.
3. Продолжайте делать искусственное дыхание и нажимать на грудь пострадавшего, так как налоксон может подействовать только через несколько минут.
4. Если пострадавший не реагирует в течение 2–3 минут, впрысните вторую дозу препарата.
5. Дополнительные дозы можно впрыскивать каждые 2–3 минуты до тех пор, пока пострадавший не отреагирует — или до прибытия скорой помощи.



ИНТРАНАЗАЛЬНЫЙ НАЛОКСОН

1. Отделите верхнюю и нижнюю крышечки шприца.
2. Навинтите белый конус сверху на цилиндр шприца.
3. Отделите крышечку капсулы с налоксоном.
4. Ввинтите капсулу с налоксоном в цилиндр шприца.
5. Вставьте белый конус в ноздрю пострадавшего. Нажмите быстрым движением на конец капсулы с налоксоном. Половина содержимого капсулы впрыскивается в каждую ноздрю.



6. Продолжайте делать искусственное дыхание и нажимать на грудь пострадавшего, так как налоксон может подействовать только через несколько минут.
7. Если пострадавший не реагирует в течение 2–3 минуты, впрысните вторую дозу препарата.
8. Дополнительные дозы можно впрыскивать каждые 2–3 минуты до тех пор, пока пострадавший не отреагирует — или до прибытия скорой помощи.

6. ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Наблюдайте за реакцией пострадавшего и оставайтесь с ним до прибытия скорой помощи.

- Продолжайте делать искусственное дыхание и нажимать на грудь пострадавшего, пока он не начнет дышать самостоятельно или пока не придет скорая помощь.
- Слегка поверните пострадавшего набок. Согните колено его верхней ноги. Поместите верхнюю руку пострадавшего ему под голову.
- Успокойте пострадавшего и объясните ему происходящее.
- Оставайтесь с пострадавшим до прибытия скорой помощи или как минимум в течение 2 часов после применения последней дозы налоксона.

Найдите наш набор средств:

Законы защищают от гражданской ответственности каждого, кто добросовестно применяет налоксон, чтобы спасти жизнь пострадавшего. Узнайте больше о действующих законах: oregonlaws.org/ors/689.681.

Найдите дальнейшие сведения на сайте **ReverseOverdose.org**



In partnership with:
Oregon Health Authority